

青椒复地膜栽培技术经验

肇东县城郊公社农业站 范中怀

青椒地膜栽培是利用塑料薄膜复盖地表的一种新兴保护地栽培措施。增产效果显著，亩产可达万斤，早熟可提早上市十天左右。青椒复地膜栽培主要应抓好以下几个技术环节。

一、选用早熟高产品种培育健壮大苗

适于地膜复盖的早熟高产品种有巴彦大青椒和中熟茄门椒。

为了保证幼苗旺盛生长，我们的做法是：

1. 配制培养土：方法是用50%田土、40%陈马粪、10%大粪面均匀混合而成：为了防止苗期病害，播种用的盖土要用药剂处理，每10斤土用2—3钱多菌灵或托布津处理。

2. 浸种催芽：将种子放在55℃的水中进行浸泡，并要不停地搅拌，待温度降到30℃后停止搅拌，然后放到常温下浸泡24个小时，再投洗干净放在28—30℃处进行催芽。

3. 加强幼苗的管理：播种前苗床要浇透水，播后出土前床温保持30—32℃，当种子有80%出土时，温度降到24—27℃。移苗后温度升到30℃，3—5天后降温到22—25℃。阴天室温低些，晴天温度可高些，夜间15—18℃。播种前湿透床土，出苗后到移植前为提高地温一般不浇水，移植时要浇足水，长到四片真叶时浇一遍水，以后要经常浇水，保证幼苗生长需要。采用降温和加大通风的办法来控制苗的生长，但水分不能过多，造成徒长或得猝倒病。前期苗出土就开始小通风，逐渐加大放风量，延长通风时间，直到后期昼夜通风，根据气候变化适当调节通风量。

二、整地施肥

翻地前将耙子拿净，草棍或石头瓦块等要把杂物检净，因地膜很薄易于将膜扎破、降低复膜作用，深翻细作，整平耙细，因土坷垃也会将膜垫出窟窿，细整地要求：土细地平，无杂草、耙子、砖头、瓦块、土块等一切损坏地膜的异物。然后打成一尺半小垅。

地膜复盖具有保肥增效的作用，同时土壤有机物质分解快，容易被植物吸收利用，如不增施有机肥料，就会使土壤的有机质含量急骤下降，破坏土壤肥力，使土变瘦。地膜蔬菜根系发达以深施肥为好，有机农家肥与化肥配合一次施入，施肥深度一般以20—30cm为宜。每亩施优质农家肥一万斤，加过石50斤。

三、及时复膜早定植

1. 复膜前进行浇水，一尺半小垅隔沟浇，然后将两垅顶搂平，做成高15cm，宽

80cm的高畦，并用氟乐灵进行处理，防止草荒，每亩用药3—5两。

2. 复膜：5月15日开始复膜，用三人复膜，一人放膜，二人压土。把成卷的薄膜平放在畦上，一人进行滚动放膜，边滚边将薄膜拉紧，用土将两边压实，防止被风吹开。复膜要作到：铺平、贴紧，不要有空隙，四周用土压实。

3. 定植：5月18—20日开始定植，定植时用5cm圆棍扎眼，用瓷缸子浇少量水将苗栽入，待水渗后，用细土将苗眼培严盖好。行距为40cm双行，株距七一八寸。

四、田间管理：

1. 畦沟里和苗周围的杂草及时拔出。

2. 设专人看管地膜，发现有窟窿将破处用土封严，发现薄膜与土贴的不实的地方要压些土。特别是风天要特别注意，防止被风刮坏。

3. 追肥灌水，青椒生长后期常有脱肥现象，进行根外追肥1—2次。根据膜内含水情况可灌水2—3次。

4. 及时采收。前期蔬菜价格较高，要抢行上市，及时采收。