

1. 什么茬种茄子好?


茄子最忌重茬、迎茬。也不宜在辣椒、番茄、马铃薯等茄科作物的茬口栽种。进行4—5年轮作、能明显地减轻黄萎病的危害。在同一地块不同茬口的比较是:茄果类茬口比瓜类病重26—61%;葱蒜类比瓜类、叶菜类茬减轻病情49—70%。因此,在安排茬口上、都优先利用葱蒜茬,其次是瓜类和叶菜类茬。粮菜区可以与肥沃的粮田轮作。水旱轮作地区用水稻茬栽茄子,防病效果好。

2. 什么土质栽茄子好?

栽种茄子的土质、以选择地势平坦、土地肥沃、微酸至微碱性、保墒、排水良好的砂质壤土为最理想。这种土壤导热快,地温高渗水好,根系发达发苗快,有利于茄子早熟。肥沃的黑油砂土也能获得好的收成。地下水位高,排水不良的粘土栽茄子渗水性差,易积水沤根。瘠薄地、盐碱地和黄土地栽茄子产量低,品质差。为了减轻黄萎病的危害,宜选返润的砂壤土地。返润地水分好,遇旱地裂少、不会使茄根大量折断,减少病菌入侵的机会。因此茄子长得高,长得壮、抗病能力强。

3. 种茄子施什么肥好?

茄子根深叶茂、生育期长多层结果,多期收获。在整个生育期间,一方面需要充足的氮肥供茎叶生长,一方面又要有充足的磷,钾肥供开花结果需要。因此,要有充足的底肥才能达到丰产和抗黄萎病的目的。底肥以发好的含磷、钾多的猪、鸡粪和大粪干混合施用为好。要求每亩施底肥5,000—10,000斤。施肥方法:粪肥充足的可结合整地进行扬施或滤施。粪肥少的要抓把肥掩施。



4. 茄子什么时候栽好?

定植茄子的时期、要根据当地、当时的气候条件和茄苗的生育状况而定。最好的定植时期是本地的晚霜(春霜)

刚过就定植。定植过早有被冻死的危险;定植过晚,虽然保险,但延迟了收获期。茄子的适宜生长温度是20—30℃,最低不能低于15℃。根据多年的气象资料统计,哈尔滨5月中旬的平均温度为22.9℃,日最低平均气温为6.2℃。5月下旬日平均气温为16.4℃,日最低平均气温为10℃。5月20日前后是历年平均终霜期,因此,哈尔滨地区茄子定植日期以5月20日晚霜过后定植为最好。其他地区可根据当地的晚霜期提前或延后定植。定植时要注意收听天气预报,根据早春“三寒四温”的变化特点,抓住寒尾温头的时机,选择晴暖无风或小风的天气进行定植。

5. 定植密度多大合适?

茄子定植过稀过密都不好。稀了光能利用率低虽单株产量高,但总产量下降;密了植株拥挤,通风透光不良,植株生长弱,落花落蕾多,影响开花结果和果实的着色。只有合理密植才能充分的利用阳光和土地。合理密植能显著地提高前期产量。由于品种不同、植株的大小不同、要求的密度不一样。我省栽培茄子多为坐作,一般垄宽2—2.1尺。

早熟品种:2尺垄株距9寸—1尺,亩保苗3,000—3,330株;2.1尺垄株距8—9寸,亩保苗3,175—3,750株。

中熟品种:2尺垄株距1.1—2.2尺,亩保苗2,500—2,727株;2.1尺垄株距1—1.1尺,亩保苗2,597—2,857株。

6. 茄子扣地膜对提早收获和增产效

果怎样? 怎样扣地膜?

茄子扣地膜可比不扣地膜的提早收获6-8天。前期增产100%,总产增产40-60%。

扣膜方法:在整好地,施足肥的基础上,然后作成高10-12厘米的圆头垄,起垄时必须使垄面土壤细碎无坷垃,镇压一次后,立即扣膜,以免土壤水分蒸发和养分流失。在土壤干燥情况下要先灌水而后覆膜。覆膜时可用铺膜机,也可人工覆膜。人工覆膜要三人一组,其中一人铺膜,另外两人往垄的两侧培土以固定薄膜。覆膜时要拉紧,使膜紧紧地贴在垄面上,不得产生皱纹或松弛。覆土时要压严,不能有漏洞,最后踩实,防止透风跑气降温和被风把膜刮坏,刮跑。

7. 怎样定植茄子?

定植的秧苗最好用营养土块或切垛、晒垛。这样的秧苗缓苗快,成活高率,并能提早收获。不切垛的要注意起苗。在定植的前一天晚上,将苗床灌透水,下午定植的要起早灌水,起苗时要注意不要伤根,尽量多带土;要起苗、选苗、栽苗连续作业,以免存放时间长秧苗萎蔫。

①不覆膜的定植在埯的中间,定植的深度以埋没土垛为度,没有土垛的要比苗在苗床深1.5厘米左右,以免倒伏和耐旱。但不可过深,否则地温低缓苗慢。栽苗埋土时,要用手轻按一下,使根与土壤密接。栽后要做好浇水穴及时按埯浇足水,待水渗下后、将埯封严、封平。三天后再灌一次缓苗水。

②覆盖地膜的茄子定植时,首先按规定的株距用刀割成十字形口,用开穴器开穴,然后将秧苗按计划深度栽植在穴内、覆土达八成厚再行灌水,水渗下再覆剩下的二成土。要用稍干的土封埯,封埯时一定要把定植穴的薄膜开口处压严,根部周围的土要略高于膜面,以防风从切口处进

入膜内,将薄膜吹起刮跑,或在切口处把膜吹成裂口,使土壤水分蒸发和散热、降低土壤温度和湿度并容易长出杂草。因此,一定要搞好定植的质量。

如何防治茄子幼苗期猝倒病

林密

茄子幼苗期易得猝倒病。这种病初发时,幼苗茎基部呈水浸状病斑,接着病部变黄褐色,缢缩成为线状,病害发展迅速,在子叶尚未雕萎之前,幼苗即成片猝倒。危害十分严重,甚至可造成毁苗。是茄子育苗中值得注意的问题。

猝倒病由瓜果腐霉菌引起。此菌以卵孢子的形式,在土壤中越冬,能在土壤中长期存活。条件适宜时即侵染小苗。病菌主要借雨水或土壤中水份流动传播,此外,带菌堆肥、农具的转移等也是传播病害的原因。苗期如管理不当,床土带菌,播种过密,低温高湿,光照不足,通风不良,闷湿等情况均可导致发病。

防治应着重从以下几方面入手:

1. 温汤浸种:水温55℃,用水量为种子的5-6倍。浸种时要不断搅拌,并随时补给温水保持55℃水温,经10分钟后,使水温降低到室常温,浸种8-10小时后再催芽即可。

2. 床土消毒:我们育苗一般采用旧温床,所以床土要进行消毒。可采用70%五氯硝基苯和50%福美双等量混合均匀(各4-5克)配方。用药量为每平方米8-10克,加半干细土拌匀。要求药土湿度为捏之成团,扔下即散,没有疙瘩为原则。在播种时,把三分之一的土均匀地撒于床面上,三分之二做为播种的复土。播种后应保持土表湿润,防止药害。

3. 苗床管理:子叶时期的幼苗最易