

种：(1) 割收～收后把根起出栽于温室进行秋冬生产。(2) 挖收～边收边掘，带根于棚内假植～遮阴保温。收后挖假植沟——沟深60cm～50cm，宽1米，于10月中下旬把芹菜掘摆入沟内，根接触到沟底土壤。棚盖覆土。11月中下旬取出上市或再进行窖贮，以便供应冬春市场。

9. 全生育期不撤大棚农膜，以放“裙风”为主。夏季揭膜至棚肩处约距地面1米高——靠农膜吸尘达到遮阴、保湿目的。要依据土情苗情适时浇水，适时采

收。割收后要接清畦面杂物、松土一次，不浇水。当新苗5cm高时再灌一次透水。追肥时根据水渠水的流量，适当把肥撒入水渠中，令其随水均匀渗入土壤。

10. 病虫害防治：轮作三年。用氧化乐果及防治蚜虫、红蜘蛛等。用百菌清500倍液时治斑枯病（晚疫病、叶枯病、俗称“火龙等”）七、八月份是发病盛期要及时收割以减少病原和寄主，防止病菌，再次侵染。喷药可结合叶面喷肥一起进行四次收获累计亩产超二万斤。

平贝母的夏秋管理

平贝母主要产于我国东北长白山一带，属于百合科多年生草本植物，鳞茎为药材，有清热润肺，止咳化痰的作用。

平贝母的生长习性是：喜冷凉湿润气候和疏松肥沃的砂质土壤。怕烈日直射和高温，在我国的北方夏季天气较热，地温也高，这对平贝母地下茎鳞茎的生长是不利的，所以必须要求种植蔽阴作物，但要及时拔掉杂草，避免杂草与贝母争水争肥。另外对不收种子的平贝母要适时摘掉花蕾，减少养分的消耗，有利于地下茎的生长。大旱时要及时浇水，雨多时还要及时排除积水，以免贝母腐烂。要追施速效和热性肥料。到老秋的时候，贝母的蔽阴物收获以后，也要给贝母松土，除草，上好盖头盼，同时要严防人畜的践踏。

国育英 据《农村科学实验》

新书讯

为满足我省发展葡萄生产和培育葡萄苗木的要求。由我所副研究员曹庆林、助理研究员王玉珣同志，总结多年来的试验和群众性的生产实践，编写出《葡萄快速育苗》一书。现在已由黑龙江人民出版社出版发行。文章内容丰富，技术先进，图文并茂。语言通俗易懂，适合广大农村两户和种植葡萄的朋友阅读。每本0.25元有购买者请汇款到“黑龙江省农业科学院园艺研究所资料室，外地邮寄每册另加0.05元汇费。