

期全株埋土为好,过3、4年后如管理水平高,生长势好,并具有第一第二条件的可不用埋土。

总的来说冬季埋土越冬的安全可靠,产量收益保证。

三、防寒方法

我省中北部生育期在120天以下的地区,要在10月10日左右开始埋土;120天以上的地区10月15日开始埋土。薄皮黑豆落叶早,应先进行,厚皮黑豆防寒时往往还不落叶,但可正常进行,先将株丛分半,然后一株的一半和另一株的一半压倒在一起,这样枝条折伤少、取土量少省

工,第二年春撤防寒土容易。先埋梢部,后埋基部,埋土后过一周时普遍检查一次,如出现裂缝、遗漏的要补培,尤其是株丛基部被弯曲部位一定要培严。埋土厚度只要把枝条盖严即可。把枝条卧倒时难免个别枝条压断,这对产量基本不影响,第二年春修剪时剪掉。特别要提醒:埋土时如土壤干燥,土块之间又有缝隙,依然出现严重的抽干现象,所以秋季干旱年份培土一定要细致认真。

第二年春解除防寒土时一定要把把所有的防寒土撤到原来取土的地方,千万不要遗留在株丛基部,以免根系上移,对今后的管理及生长不利。

萝卜新品系——冬红

“冬红”,是伊春市农业科学研究所从王兆红品种中经系统选育的秋萝卜新品系。在一九八四年的黑龙江省品种审定会上受到专家们的好评。其特点是:

1. 冬性强,抗抽苔。在王兆红陈籽抽苔率平均为23.85%的情况下,冬红只抽1.02%。

2. 丰产性:82年经新林等六点试验比王兆红平均增产50.26%,83年五营等六点试验比王兆红平均增产56.36%,本所试验结果七八年平均亩产5.791斤(王兆红为对照)。比对照增产76.82%,84年平均亩产6.974斤,比对照增产53.31%,平均亩产6.383斤,比对照增产65.57斤%,

3. 抗病性:82—83年20点次调查均没发现黑腐病和病毒病,是抗病性很强的

品种。

4. 商品价值:肉质根一般为圆头形,有的稍扁,皮色鲜红。顶小根细,肉质根长15—20cm,肉白脆嫩,辛辣味适中,不爱糠心。丰产性能好,最大单株重10斤,平均2—3斤。

由于冬红品系冬性强,产量高,抗病性强,多年来在山西省中阳县,内蒙古牙克石林管局、大兴安岭北极村的漠河、呼玛、西林吉、新林、塔河、根河、黑河、牡丹江、鸡西、鹤岗等市县均有种植,仅伊春市区(包括各林业局)85年播种面积达2万亩。

栽培要点:除播期可比王兆红提前5—10天外,其它与一般品种相同。

(肖玉先)