

红油皮栗在勃利县庭院有栽培

勃利县果品公司 王培清

1968年勃利县恒太乡长安村果树技术员陈琳，在房后园子里栽培一株红油皮栗，现在已有18年的历史了。植株表现耐寒，虽然当年新梢、花芽稍有轻微冻害，但恢复力很强，后期生长发育旺盛，有一定产量，并摸索一套栽培方法。笔者认为可在本地区发展。此外，林口、密山、七台河等地和省林业科学院均引种试验。

一、植株表现：

树势生长旺盛，树形开展，萌芽和成枝力均强，以腋花芽结果为主。植株生活习性和柞树相同，叶片和柞树一样。6月中旬展叶，萌发后老叶脱落，7月下至8月中旬是花期，花有臭味。果实9月中旬成熟，每个总苞（栗蓬）内有栗子3粒，皮红褐色。采收后的栗子，用火一烧，风味佳，品质好。

二、栽培方法：

1. 嫁接及管理：1968年3月中旬，以柞树做砧木，红油皮栗为接穗，在砧木离地面5—15厘米处劈接。接后选留一个生长好的新梢，其余芽子抹掉，然后立柱绑缚两次。当接口已经愈合，接穗萌芽抽枝时，要及时撤出培土。

2. 翻树盘：红油皮栗生长旺盛，喜土质疏松。一般在5月上旬翻菜园时，顺便翻一下树盘，深20~30厘米左右；范围与树冠大小相等。

3. 施肥灌水：红油皮栗与其它果树一样，要想达到丰产，必须在修剪等综合管理的基础上，相应地加强肥水管理。10月上旬结合秋翻，每株施100斤土杂肥，春季追施腐熟人粪尿每株150~200斤。适当灌水。在土层薄、土壤干旱时施人粪尿，易烧根，必须充分灌水。

(上接第5页)

I. 菊科 Compositae

1. 向日葵属 Helianthus

(1) 菊芋 *H. tuberosus* L.

主要品种为薯不辣（又名鬼子薯）

十一、多年生菜类 三科四属四种

I. 茄科 Solanaceae

1. 枸杞属 Lycium

(1) 枸杞 *L. barbarum* L.

II. 百合科 Liliaceae

2. 萱草属 Hemerocallis

(2) 黄花菜；*Hemerocallis* Hava

L.

主要品种为黄花菜

3. 石刁柏属 Asparagus

(3) 石刁柏；*A. officinalis* L.

Var. *atilis* L.

III. 桔梗科 Campanulaceae

4. 桔梗属 Platycodon

(4) 桔梗；*P. grandiflorus* A. DC.

主要品种为桔梗