

应以氮肥为主，尤其对未成龄铁树（二十年以下）更是非常重要，可配合磷钾肥施用。移到室外后一般每十天施肥一次。可施液肥（蹄片水、豆饼水、马粪肥水）但浓度不能过大，液肥中可加入矾肥水，增加土壤里的铁离子会使叶色浓绿发亮有光泽，促进光合作用。

铁树在北方地区陆地不能过冬，秋天要严防冻害，一般九月上中旬移回室内，放到温度高、阳光充足的玻璃窗下，温度维持在25℃左右。冬天最低温度维持在13℃以上。

移回室内后对黄叶要剪去，修剪时留下的叶柄要长短一致注意美观平时管理要注意保护叶片完整，防止伤叶。

北方盆栽铁树一般采用分株繁殖和切段埋藏繁殖二种。

分株繁殖法：分蘖芽球状，正常生长发育每年要从茎基部出现分蘖芽一到几个。分蘖芽长出后要从母体上切除，先放

到阴凉处1—2周，然后可几个一起埋到用三分之二腐植土和三分之一细沙配合而成的床土里，芽要向上。亦可把分蘖芽栽到其它的花盆里，如君子兰、橡皮树等。要求花卉枝叶对分蘖芽有一定遮阴，但还必须保证能见到一定光照。

埋插繁殖法：就是把铁树茎切成一段，每段5—7cm，切下后放到阴凉处，晾干后埋入培养土用细沙或细沙与腐植土各半，但必须消毒灭菌。采用这种办法出芽慢，一般二年后才能发芽，出芽后可把小芽切下栽到花盆里，但一定要带一片叶子。

铁树病害少，常见有介壳虫为害，特别是在通风不良的条件下常有大量发生，发生时喷1000—1200倍敌敌畏即可消灭。

铁树除了它的观赏价值外，茎内髓部含丰富淀粉可食用。叶入药有收敛、止血、止痛的功能。根可治筋骨疼痛、风湿麻木、肾虚牙痛。

※

※

※

## 秋栽大蒜连续八年丰收

黑龙江省绥稜县长山乡黄明，秋栽紫皮大蒜连续八年获高产。他的作法是：土地栽蒜前，复种白菜、萝卜、香菜，到10月1日前复种菜收完后，立即翻地，施足底肥，打成50厘米宽的垄，然后把蒜栽成

双行，每平方米栽50头左右，株距8厘米。栽蒜时间，以当地封冻前为宜，栽早了天暖和容易出芽，栽晚了蒜的须根扎不下去，越冬有危险。封冻时要抢在雪前，在蒜垄上覆盖10厘米厚的草防寒。用这种方法种出来的紫皮蒜头大，产量高。与春栽大蒜比较产量相差3—4倍。

（于颖）