

含量: 228.1毫克%。

滨海冠军黑穗醋栗(Приморский чемпион)。

是在西伯利亚获得的品种, 越冬力最强, 开花最早, 具有自花结实的特性, 早熟品种。

矮生黑穗醋栗(Карлик)。

滨海巨型黑穗醋栗(Приморский-великан)。

雌鸽黑穗醋栗(Голубка), 浆果, 平均0.38克。维生素C含量: 138.5毫克%。丰产性: 四年生(1980~1983), 平均26.5公担/公顷。

雌鸽实生黑穗醋栗(Сеянец голубка), 是野生醋栗、欧洲黑穗醋栗和西伯利亚亚种的第三代, 生长中等、果型大, 味美、薄皮、果柄连接牢固, 不落果, 早熟、定植后四年内平均产量57.4公担/公顷。抗白粉病, 不抗芽壁虱。

谢维梁卡黑穗醋栗(Северяка), 早熟。

博斯科普斯巨型黑穗醋栗(Боскопский великан)。

鲁滨黑穗醋栗(Рубин)。

瀑布黑穗醋栗(Каскад)。

※

※

※

蒜苗增产有新招

我们向大家介绍一种能增加蒜苗产量的好方法。将农乐牌稀土一钱溶在三十斤冷水中, 再将选好的蒜种三十斤浸泡在水溶液中放置二十四小时, 然后捞出控干后, 就可栽蒜了。经过这样处理的蒜种, 实践证明, 能做到出苗整齐, 蒜苗粗壮, 颜色深绿, 增产效果显著。每平方米可多产蒜苗5~8斤, 增收4~6元。(高奎兴)

一斤七两的番茄

1986年七月二十五日大庆油建农工商联合公司红一站菜地菜采收了1个一斤七两的番茄。这个菜地曾在八四年采收过一斤半的, 八五年采收过一斤三两半的, 他们只所以采收这样大的单果主要有以下几项技术措施:

1. 采用高产质佳的强力米寿品种, 每年进行单株选择。
2. 采用单干整枝, 栽培密度合理(株行距33厘米×65厘米)。

3. 定植缓苗后进行蹲苗, 促进营养积累, 使营养生长转为生殖生长。

4. 结合喷药叶面喷施磷酸二氢钾, 亩施量3两。

(李旭东)

大白菜入窖后的管理

大白菜入窖后的管理工作大体可分为三个阶段: 第一阶段是白菜入窖至严冬以前, 这个时期要保证白菜不受冻的前提下, 搞好通风换气, 要结合倒菜, 把菜堆中的湿热空气排出窖外, 使菜温下降。第二阶段是冬季最冷的季节, 这段时间的外界气温和窖温显著下降, 此时除换气时间外, 要加强窖内保温措施, 应将窖顶所有气眼和门窗堵塞, 减少倒菜次数, 加强排湿防冻。第三阶段是开春后的时间, 这时气温开始回升, 窖温和菜温逐渐增高, 菜容易烂, 这时要增加倒菜次数和延长通风换气时间。

(于颖)