

结实。果台副梢和新梢一般当年即可形成花芽,花芽形成率达40%左右,无大小年现象。生理落果较少,产量稳定。5月中旬盛花期,7月末到8月初果实成熟,为极早熟品种。

适应性强,经过多年观察,抗寒能力相当于延边大香水梨,抗腐烂病和抗黑星病能力均较强。

## 果实经济性状

果实近园形,果实纵径5.1cm、横径5.6cm,果形指数为0.91。平均单果重105克、最大单果重190克,果实大小较整齐。采收时果实底色浅绿,贮存后变浅黄。果点小、中多。梗洼狭深、无锈瘤,部份果肩有不规则小块锈斑。萼洼中深,有2~3条浅沟,萼片宿存、扭开。果梗侧弯、长4.4cm。果面有微腊质光泽,果皮较薄,果肉乳白色,先期甜脆,后期细软,微有香气,果汁多。石细胞较少,果心中大、下位,种子大、褐色。可溶性固形物12.84%,酸0.35%,糖12.5%,维C0.66%,品质中,上。耐运输,无后熟期,食用期40天左右。

## 栽培技术要点

1、黑龙江省、牡丹江、鸡西和合江部分地区可低接栽培,省内其它地区高接栽培为

宜。吉林、辽宁、河北和内蒙大部分地区低接栽培均可。上述地区现在共栽植5万余株。

2、栽植密度株行距以 $3 \times 5$ 或 $4 \times 5$ 米为宜。

3、由于该品种高度丰产,负荷量大,大型结果枝要撑杆、吊枝或适当疏花疏果。

4、幼树修剪不易过重,进入盛果期的树要通过修剪控制留果量。

## 生产评价

经多年试验观察和生产用户评价伏香梨具有下述一些特点:

1、抗寒能力相当于我省主栽品种延边大香水梨;抗逆性较强,适应范围广。

2、幼树开始结果年令早,低接栽培幼树第三年100%植株开始结果,高接第二年结果,经济效益早,深受生产者欢迎。

3、伏香梨以短果枝腋花芽结果为主,当年新梢形成花芽能力强,丰产、稳产,低接栽培幼树第三年平均株产1公斤,4年生平均株产9.5公斤,5年生平均株产14.3公斤,最高株产5年生20公斤,7年生55公斤。

4、果实成熟期为7月末到8月初,此时为市场梨果淡季,售价高,竞争能力强。

5、果实品质较好,经济效益高。(本文作者蒋俊国为黑龙江省园艺所副研究员,收稿时间1987年4月7日)

## 食物相克解救法

食 物	危害程度	解 救 方 法
团鱼与苋菜	死亡	吃空心菜一两。
龟肉与冬笋	中毒	甘草三两煎水服。
鲫鱼与冬瓜	中毒	吃空心菜四两。
黄鳝与白菜	死亡	牛黄五钱水冲服。
田螺与蚕豆	胀肠痛	吃童便。
肉与杨梅子	死亡	吃人乳。
鹅肉与柿子	死亡	绿豆水煎服。
鸡肉与芝麻花	死亡	甘草一两水煎服。
狗肉与绿豆	胀破肚	吃空心菜三两。
兔肉与芥菜	中毒	吃杨梅水。
羊肉与西瓜	中毒	甘草二两煎水服。

食 物	危害程度	解 救 方 法
猪肉与菊花	死亡	细辛二钱、川莲五分煎水内服。
鸡蛋与消炎片	中毒	吃桐油五钱。
煎鸡蛋放糖精	死亡	黄连二钱煎水服。
蜂蜜与生葱	死亡	大米炒枯碾末,配甘草二两煎水调服。
黄瓜与花生	中毒	吃霍香丸。
甜酒与糖精	中毒	甘草二两水冲服。
桃子与烧酒	昏倒,多吃则死亡	吃牛黄丸三粒。
此外,孕妇多吃螃蟹则流产,无法解救。		
(龙宁)		