

沙培韭菜

通常栽培韭菜年收割3—4次,其余时间为休闲期。为了充分发挥韭菜高产、长寿的特性,做到月月收获、周年生产、连年采用,可以实行沙培法种植韭菜。做法是:1、选择适宜的沙子(水沙和旱沙均可),沙粒的直径不小于1mm,以2—3mm为宜,沙中含土量不超过10%,最好不带土。2、栽培床的准备:栽培床可造成大型木槽、木盘或高粱秸槽、水泥槽均可。槽长可因地制宜,槽宽以作业方便为准,床高18~20cm,脱离地面,可以搞双层或多层,床的间距和高矮应根据温室大小、高矮决定,以互不遮阴或少遮阴为准。家庭栽培也可采用花盆、木盒作栽培床。3、韭菜根的准备:最好选用二年以上的露地韭菜根较好。4、定植方法:把露地韭菜根刨出,以15—20或30—40株为一撮,剪掉韭菜叶,留下短缩茎,按半寸左右株行距,插花栽到沙培床上。深浅以沙粒不盖短缩茎为宜,盆栽可适当密一些。5、水肥管理:韭菜根栽完当时一定要浇透水,以后可以见干见湿浇水,待新根长出后再浇营养液。营养液的浇法是每隔两次清水,浇一次营养液,各季大约3—5天浇一次,春夏季2—3天浇一次。主要的应根据天气和苗情灵活掌握。韭菜叶黑绿时,表明营养成分过多,可少浇营养液,间隔时间稍长一点,并要多浇清水。韭菜叶发黄,表明养分不适,应多浇营养液,间隔时间短一点,少浇清水,阴雨天不浇,下午和夜间不浇。6、营养液的配制:有两种配方供选用,配方一:尿素1.5克(硝酸铵2克)、磷酸二氢钾0.5克,水1,000毫升。配方二:尿素1.4克(硝酸铵2.3克),磷酸二氢钾1.3克,水1,000毫升。7、温度的控制:在床温6℃气温10℃的条件下就能生长,以床温14—18℃,气温16—25℃为宜。8、移栽定植时间:最好在5月1日前进行,8月中旬到11月上旬最好不移栽,以免影响休眠。11月中旬到第二年8月可以移植,生长量不如5月1日以前这段时间好。9、收割的时间:以一个月左右收割一次比较理想。(龙元禄)

《河北农业科技》1988年征订启事

《河北农业科技》主要刊登我省农、林、牧、副、渔等方面的科学技术,宣传交流科学种田的新经验,新技术、新成果,普及农业基本知识和常规技术。

它适合广大农民群众、农业科技人员、生产管理人员、技术推广人员和农业院校师生阅读。

《河北农业科技》为月刊,每月2日出版,16开本32页,彩色封面、封底。每期定价0.35元,全年4.2元。代号18—9。由石家庄市邮局发行。欢迎单位和个人到当地邮局(所)办理订阅手续。如在当地邮局订阅困难,也可在本编辑部邮购。

1988年《微生物学杂志》征订启事

《微生物学杂志》主要任务是开展学术交流,反映国内外微生物领域的进展与动向。本刊为季刊,每期80面,主要栏目有“研究报告”、“研究简报”、“实验与技术”,“进展与评述”,“专题译述”、“技术讲座”、“成果与产品信息”及“会议简讯”等。读者对象为本学科的科技工作者、大专院校师生及有同等水平的专业干部。

本刊全年订价4.80元,1988年暂由本刊编辑部征订和发行。订阅者请直接汇款到辽宁省朝阳市文化路《微生物学杂志》编辑部。