

晾晒后剥净泥土。

(二) 贮藏、山药的贮藏方法有两种。

1、埋藏法：在室外选通风干燥处，挖深、宽各1—1.5m的坑，放一层山药，加一层细干土或黄沙，上面用土封严，天冷时加盖草帘。在室内地面上，用砖砌高约1m的埋藏坑，坑底铺一层干细土或黄沙，再一层山药一层土或沙，放满后用干细土或沙封严。天冷时加盖草帘。

埋藏后一般隔一月抽查一次，及时剔除有病腐烂的。一般可放到3月底。这时，可将其取出，置竹篮中挂于室内，可延至6月，食用价值仍然很高。

2、筐藏法：用竹筐或板条箱，筐下部和四周垫一层麦草或稻草，将山药平着放入筐中，至八成满时再用麦草盖严。

(三) 加工、加工干制新收的叫鲜山药，供食用。入药者需加工干制成“成货”，成货有两种规格：一种是将鲜山药制成毛山药（毛条）；另一种是再将毛条作成光山药（光条）。后者外形美观，主供外销。

山药加工干制的工艺流程为：

切龙头→洗净、去皮→熏硫干燥→搓→晒→修整洗刷→包装。

（本文作者为西北农业大学园艺系付教授收稿时间87年9月5日）

榨菜北引试种成功

王学彦

（吉林双辽县种籽公司）

榨菜又称茎用芥菜，属十字花科长日照蔬菜，原产在我国西南地区，为我国独有，四川的特产。近两年，双辽县种籽公司引进部分榨菜品种，在全县进行多点试种，平均亩产净菜头2450公斤，亩产值达1000元以上，取得了较高的经济效益。榨菜茎、叶和菜头均可制成咸菜，炒食新鲜榨菜头更独具风味。现将榨菜栽培技术简介如下：

一、品种：引进试种的榨菜品种有：“早园”号、“半碎叶”、“西三”三个早熟品种，进行连续两年的多点试种，其结果：“早园”号榨菜在我地区突出表现高产，平均亩产在3000公斤以上，菜头匀称，平均菜头重0.20—0.25公斤，最大可达0.5公斤。“早园”榨菜生育期70余天，生长旺盛，抗病毒病，适合北方种植。

二、播期：通过多点的播期试验结果表明，榨菜在双辽的最佳播期为8月1日—5日。播期过早易抽苔和遭受病害，过晚产量降低。一般比秋白菜晚播7—10天。

三、整地与播种：选择排、灌方便的肥沃土地，施足底肥、亩施腐熟有机肥一吨，配合施用磷酸二铵25—30公斤，钾肥7—10公斤。撒施底肥后随即深翻耱平土地做垄，垄距40—60cm，垄高16—20cm。采取条播，撒籽后覆盖1厘米左右土，然后镇压。亩用种量4两。

四、田间管理：榨菜出苗后及时中耕除草，2—3片叶时，间苗一次，4—5片叶时定苗，株距6—7寸。行距40厘米，每亩7000—8000株，行距60cm，可采取双行留苗。榨菜出苗后一个月生长缓慢，此时加强中耕除草。遇早浇水1—2次，适当蹲苗。9月中、下旬榨菜头开始膨大，叶片迅速生长，需要水份和氮肥增多。10月上旬以后菜头迅速膨大。所以在9月中旬和10月上旬前后分别追速效氮肥2—3次，每次用硝酸铵10—15公斤，追后浇水，菜头膨大后约7—8天给水一次，但每次水量不宜过大，收获前10天停止给水。及时防除病虫，发现蚜虫，菜青虫及时防治，并及时防治病毒病。肉质茎怕冻，在霜降前适时收获。（收稿时间88年1月16日）