

庭院葡萄栽培

吕 洪

自农业生产实行联产承包责任制以后,各地出现了不少利用庭院栽培葡萄的典型户,怀来县暖泉乡夹河村共564户,利用庭院栽葡萄的有231户,年产葡萄10余万斤。其中有83户超过千斤,收入都在400—500元。庭院葡萄经济实惠,既美化了庭院,净化了环境,又能增加收入,农村利用庭院栽植葡萄的可以充分利用土地,不占用劳动时间、便于管理,投资少,效益大,几乎年年丰产丰收。有条件的户都可以利用庭院栽植葡萄,确实是一举多得的致富之路。

庭院葡萄的栽培技术:栽植时间要早于大田,不论育苗或插条均应在3月下旬栽好。栽植方法要因地制宜。如院子东西向长,可在东西墙的两边离墙根1米左右栽植;让葡萄蔓向中间爬;院子南北较长,可在南墙根栽苗,向上爬蔓;院子南北向较长,还可往住房上爬蔓;院子大、道路长的可在路两侧栽植葡萄架下是人行道。还可在畜、禽舍边缘种植。庭院葡萄适宜密植:一般穴距1米,每穴栽2—3株,每株留1—2个主蔓。葡萄架一般为网式棚架、屋顶式棚架或倾斜式棚架。高1.5—2米。栽葡萄时,如天气条件差,可复土2—3厘米厚或用塑料薄膜复盖保护。成活后要及时加强管理,具体应抓好以下几点:

掰芽:指掰软芽,即萌发后无花序的弱芽。掰的越早越好,伤口小,影响小,不致浪费过多的养分。

摘心:一般情况下,结果枝应留7—8个节,即在果穗上7—8个叶片处摘心,促进果实生长;副梢留1—2片叶摘心,减少养分消耗;对先端延长梢,第一年不能留得过长,3—5年的幼树肥水条件较好,每年可留1—1.5米左右;10—15年生的大树,每年留40—50厘米。延长梢摘心,北部在7月下旬或8月上旬;石家庄以南以9月上旬进行为宜。

绑条:这是一项比较细致的工作。要求早绑,细绑,一般枝条生长到25—30厘米时就要绑条,把架面空间均匀布满。绑条时稍加弯曲,即所谓“弓形绑条”。这样绑后,枝条内的水分、养分缓慢流动,容易积存在枝芽内,促进枝条成熟、花芽分化和控制当头枝条徒长。绑条时间以上午11时至下午4时为宜,此时枝条不易折断,可随意进行。

送穗:在摘心、绑条中把果穗送顺到架下,使其均匀下垂,防止果穗骑在枝条上,形成“骑马穗”给采摘带来困难。

施肥:萌芽前,开花前,果实迅速膨大时,直到越冬防寒前的各个时期,均应施肥、浇水一次。肥料以人粪尿、圈肥、饼肥为主,距根50—70厘米处,挖40—50厘米的深沟或坑,把肥料施入,然后复土浇水。

防病灭虫:庭院葡萄一般通风较差,在生长期极易发生病虫害,应引起注意。常见的病虫害有:

白腐病,多出现在枝梢、果穗、果枝上,特别在通风不畅的地方尤易发生。病斑淡褐色,以后渐变深。病菌多从伤口侵入。在雨季到来之前半月左右,可喷一次600—800倍退菌特液或800倍赛欧散液,或180倍波尔多液进行预防。

霜霉病,近年各地普遍发生。在叶背面出现一层霜一样的霉层,叶脉出现不规则黄色斑点,逐渐扩大前颜色加深,叶片干枯脱落。在雨季到来之前,每隔半月喷一次200倍波尔多液,或600倍乙磷铝,或1,000倍阿普隆,直到9月上旬为止。

另外,为消灭浮尘子为害,一般可喷50%敌敌畏或乐果800倍液。如在生长季节发现红蜘蛛时,可喷0.2—0.3%石灰硫磺合剂1—2次,以消灭为害。

冬剪:庭院葡萄肥水好,管理及时,应采用扇形整枝,中、长梢修剪。北方埋土防寒地区,要比大田迟5—7天埋土,防止过早入土“闷条”。在比较温暖地区,如不下架越冬,剪枝后浇一次透水即可。

