

(接上期)

## 介绍北方几种盆花栽培技术

**3 月季：**又叫月月红、长春花、蔷薇科，蔷薇属。

原产我国，目前世界各地均有栽培，我国有几千种，现在又育出许多新的品种。

月季是一种低矮落叶小灌木。茎有刺、坚硬，小叶3—5片，阔卵形或卵状长圆形，边有细锯齿，花有紫红、粉白、黄色等，通常簇生或单生，单、重瓣均有，花期较长，在适宜温度下，春、夏、秋三季开放，冬季休眠，主要花期5—9月。

月季适应性很强，喜阳光和通风良好，温暖的生活环境，在22℃~25℃左右生长良好，较耐寒，不喜高温，在春秋两季开花多，颜色正，30℃以上高温，生长不良，要遮阴。在哈尔滨露地栽培，防寒严密，也可露地越冬（较耐寒品种）。月季喜肥，开花次数多，消耗养分多，应勤施肥，疏松肥沃微酸性土壤为好。

月季繁殖法，一般是扦插，也有嫁接，扦插多在春秋两季进行，春季结合修剪，出室前扦插，秋季在进室前扦插。具体做法：选半木质化枝条，剪成6~7厘米长，上面留两片叶子，下余剪掉，插到砂箱、床上、用塑料棚盖好，放有阳光处，但温度不能过高，保持一定湿度，生根后可打开棚通风，而后盖好，等长出新叶前塑料棚拿掉，养护一段时间上盆。

上盆用园土5份，马粪土4份，粗砂1份，上盆后浇透水，放避阴处一周后，移到有阳光通风好处养护，养护过程中，要注意浇好水，水量不能太大，保持湿润就行。

月季开花多，消耗养分多，主要是氮肥，应经常浇豆饼水，花后及时修剪，保持再开花，冬季贮到冷室休眠，保持明年春季开花好，但时间长，少量浇点水。

月季易生白粉病，主要原因是温度高，湿度大，通风不良造成的。要放到通风好的地方，少浇水，见发白粉病把病叶剪掉，大量发病可用稀薄的石硫合剂代森锌喷布。遭蚜虫或红蜘蛛危害时，可喷

1500~2000倍敌敌畏或乐果防治。另外有的月季生长不良只长叶，不开花，主要原因管理不当，应加强肥力，及时修剪，减少枝叉过多。

**4 扶桑：**又叫木菊、木槿、朱槿牡丹，锦葵科，木槿属。原产我国南方。

它是常绿灌木，多分枝，叶广卵形或卵形叶子有光，边缘有锯齿，花单生于新梢叶腋，花大漏斗形，有红粉、黄白等色，有单瓣重瓣之分。花期在夏季，温度适宜，四季均可开花。

扶桑喜阳光，温暖湿润的气候环境，不耐寒，对土壤要求不严，不怕晒，冬季管理关键在温度，南方露地栽行道树观赏，北方多作盆栽观赏，冬季移入室内养护，室温15℃左右即可。

繁殖方法，以扦插为主。春季3月份在室内进行，剪10厘米长新梢枝条，插入素砂箱中，砂温要达到25℃左右，夏季可在育苗温床里扦插，插后浇透水，1个月左右可生根。扣塑料棚或盖玻璃窗，每天要浇2次水。

上盆用园土5份，马粪土4份，粗砂1份混合使用，扶桑萌发力强，结合繁殖进行短截修剪，使其多分枝，多开花，二年重剪一次，只留2~3个芽，上部枝条全剪掉。早春换盆要少加豆肥或马蹄片做基肥。夏季生长旺盛，消耗养分多，要施追肥，每周1次，早霜前移入室，冬季室内保持在15℃以上。

注意扶桑脱叶、冬季、早春温度低，受冷就落叶，有的落花，因水分太大，枝条徒长，养供俱不足，花蕾坐不住，产生落蕾，要控制水分，修剪徒长枝等。

## 仙人掌类植物与湿度

仙人掌类植物由于原产荒漠高原，一般都较耐干旱，大部分能在干旱条件下存活，大球形植株1—2年不浇水也不会干死，但如果片面认为其性喜干旱，任何时间都要求干旱，是不科学的。所以，在栽培管理中，应该合理浇水，除在其休眠期应该严格控制浇水外，一般应保持盆土稍湿润，不过分干燥，总的来说，仙人掌类植物也要有个湿润的环境，才能保证正常的生长和发育。合理调整湿度应注意以下几点：1.冬季温度低，应该严