

向您推荐高效植物生长素

高效植物生长素是广州军区司令部加乐饲料添加剂厂全体科技人员吸取国内外资料,根据我国粮食、水果、蔬菜和其它作物生长需要,经多年研制,试验后推出的又一新的科研成果。对植物的生长、发育具有特殊作用,能加速细胞分裂,促进作物生根,提高肥料利用率,增强光合作用,提高叶绿素含量,增多植物开花数,保花保果有明显作用。对粮食、薯类、水果、瓜类蔬菜等作物大面积施用,能提高产量20—50%,本产品易溶于水,无臭味,对人畜无害,使用安全简便,是一种价

廉,经济效益较高的新型高效植物生长素,本产品用塑料瓶包装、每瓶12毫升,一元钱一瓶,可喷1—2亩。

该产品特点:应用范围广,用量小,见效快,对土地肥力无损害,不改变植物原质原味,其主要成份有:细胞分裂素、氮、钙、磷、钾、钼、镁等有机质。施用本产品一般晴天下午喷较好,喷后六小时内遇雨需补喷。施用方法(见附表)

该药我部出售,每瓶1元,一联10瓶10元办理邮购,邮费自负。

黑龙江省农科院园艺研究所

哈尔滨市动力区种子经营部

联销处 白富林

(使用方法详见附表)

高效植物生长素施用方法参照表

作物名称	每瓶12毫升 兑水量(市斤)	施 用 方 法	增产幅度 (%)
水稻	60—100	在开花、灌浆期各喷一次	20—25
小麦	60—100	在拔节、扬花时各喷一次	20
玉米	50—60	在八叶、扬花期各喷一次	15—20
大豆	60—100	在初花、结荚时各喷一次	30—40
花生	40—60	在初花、结果时各喷一次	30—40
油菜	30—40	在苗期、扬花时各喷一次	20
棉花	100—200	初花、结铃期各喷一次	15—30
水果	60—100	初花、壮果期各喷一次	30—50
甘蔗	20—40	在生长期喷2—4次	20—35
蔬菜	30—60	在定植后5—6天喷施,以每隔四天连喷2—3次	20—50
茄类	30—60	在生长期喷1—2次	40—60
瓜、茄、辣椒	20	在生长期喷一次,以后每隔10天连喷2—3次	40—60

拔丝瓜条

西瓜皮巧做两味

主料:净瓜皮肉(西瓜皮削去外老皮)400克。

调料:干面粉50克、淀粉100克,白糖100克、鸡蛋1个,盐少许,食油500克(实耗75克)。

制法:瓜皮肉切成1厘米长、宽厚各0.4厘米的长方形条,用沸水抄一下,凉水过一下,控净水撒上干面粉拌匀,另以淀粉、盐、鸡蛋加凉水搅成蛋糊备用。

炒勺上火烧热下油,待油温七八成热时,将瓜条裹匀蛋糊下油炸,炸至表面金黄色捞出控净油,勺内留25克油,放入白糖,上小火用筷子轻搅,并不停地转勺使糖液受热均匀,待糖完全溶解成液体无颗粒时,迅速把炸好的瓜条倒入勺中,颠匀,使

海米烧瓜块

主料:净瓜皮肉100克,海米15克,油菜心或菠菜心6棵。

调料:葱姜末少许,料酒,盐少许,味精10克,淀粉少许。

制法:瓜皮肉洗净成滚刀块,分别将瓜块、菜心用沸水抄一下,清水过凉控净待用。海米提前用热水泡两小时。炒勺上火烧热放油,葱姜末炆匀后撇出不要,投入海米、料酒、高汤、盐、味精烧开,去掉浮末,下入瓜块、菜心,大火烧开,中小火烧两分钟,再大火挂芡收汁,淋入明油,出勺装盘将菜心放于瓜块之上即成。

糖液均匀裹住瓜条装入抹过油的盘中,撒上些青红丝即成。

(闻惠)