

面干燥,又可保暖,仔猪还可在垫圈土中获食一些矿物质,可有效地防治仔猪白痢病。(杜维军)

冬季猪瘫痪病的防治

冬季天气严寒,光照时间短,多因猪舍潮湿,寒风侵袭,受凉等原因,致使猪患风湿症而造成瘫痪,另一种原因是,由于饲料中长期缺钙,尤其是怀孕母猪、哺乳母猪因钙质消耗过多而补充不足,或因饲料过浓,磷酸盐类过多,体内钙磷平衡失调,导致发生骨软症而瘫痪。

风湿性瘫痪和骨软症引起猪瘫痪,临床症状的区别是:患风湿症的猪四肢肌肉疼痛,步样强拘,跛行,随病情严重,则起立困难而瘫痪。本病特点是:强迫病猪运动,可因活动时间延长而跛行减轻,而骨软病猪,初期四肢关节疼痛跛行,其特点是:随运动时间增多跛行加剧,病情严重时,则瘫痪不能起立。因两种瘫痪原因不同,在防治方法上也不同。

猪风湿性瘫痪预防措施:要做好符合防寒,地面保持干燥、防止潮湿、要温暖,日光足,避免阴冷,防止贼风,训练猪不尿窝,每天中午天气暖和之时把猪放到外面适当运动,以利增强体质,增加抗寒力。

猪风湿性瘫痪治疗方法:①用水杨酸钠粉5克,小苏打5克拌食内喂,每天1-2次,连喂1周,停喂2-3天后,可继续服用。②在腰部两侧或臀部肌肉注射2%安乃近10毫升。③肌肉注射氢化可的松注射液,每头猪每次剂量为0.02-0.03克,每天1次。

骨软症引起的猪瘫痪预防措施:给猪的饲料中补充足够的矿物质饲料,多种维生素添加剂,如:生长素、多维生素、微量元素等饲料添加剂和骨粉、贝壳粉等。此外每天让猪到外面多晒太阳,以利对饲料

中钙磷营养的吸收。

对已患骨软症的病猪,除在饲料中补充矿物质饲料外,还要肌肉注射骨化醇1-2万单位,每周1次,共注射2-3周。为减轻疼痛,可肌肉注射安乃近5-20毫升,每天多晒太阳,以利康复。(张蓄民)

鸡鸭驱虫禁用敌百虫

敌百虫为广谱性兽用驱虫药,对猪、牛、马等家畜驱虫安全有效,而鸡、鸭驱虫禁用此药。因为敌百虫属于有机磷药物,在碱性环境中可产生毒性很强的敌敌畏,而鸡、鸭的嗦囊内多为碱性环境。因此,鸡、鸭服用敌百虫易引起中毒,甚至死亡。鸡、鸭驱虫可选用驱虫灵,按鸡、鸭每公斤体重内服二百五十毫克,或内服左旋咪唑十至二十毫克。(谢胜才)

养鸡新法

1.蛋鸡产蛋期投药时间,对产蛋率有影响,试验表明,每天下午3时左右一次投食产蛋率最高,上午8-9时一次投食产蛋率最低,上午6时和下午3时左右分别投食一次也较好。

2.采用短期禁食法可使产蛋量提高30-50%。即人初产日龄的前10天开始禁食3天,给食1天,但给食的营养总量应达到4天的最低需要量。连续10天后,再让母鸡自由采食。

3.在母鸡产蛋期,每平方米鸡舍在安装一盏3-4瓦的日光灯,早上开始光照,对20周龄以下的鸡每天光照10小时左右,20周龄以上的鸡一般光照16小时左右,可刺激母鸡的胚胎腺,从而提高产蛋率。

4.对鸡进行弱电刺激,可使产蛋量提高20

40%,并能延长产蛋期。方法是:在鸡开始产蛋的第7天,用50-70伏电压的正负极棒的尖端分别接触鸡体表面和卵巢相应的部位,经3秒电刺激后间歇1秒,随后再刺激3秒即可。

5.从雏鸡开始用发酵锯末饲料喂鸡,有意推迟鸡的发育成熟期,让鸡在250日龄时进入盛产期,产蛋率可达75.3%,并能维持到700日龄。其配方是:发酵锯末20%,谷类50%左右,30%左右的米糠、豆饼、骨粉、鱼粉、瓜菜、青草、外加一些维生素和石小头。(王农)

能帮助御寒的食物

狗肉:我国民间,历来有吃狗肉以助阳御寒的习俗。狗肉性味咸温,入脾、胃、肾经,有温肾助阳,补中益气之功效。多以炖煮食用,若食用后出现口干咽燥等不适症时,可饮服米汤解之。服用时不宜与杏仁、菱同食,感冒发热及阴虚火旺者忌食。

羊肉:羊肉亦是我国人民用以御寒的一种传统食品,其性味甘温,入脾、肾二经,有温中暖下,益气补虚之功效,故《本草纲目》中曰其「益气则阳之足,故能疗...虚劳寒冷也」。羊肉炖煮、煎汤食用均可,但不宜与荞麦、豆浆同食,以免引发宿疾,外感时邪或内有宿热者忌食。

鹿肉:梅花鹿或马鹿的肉,其性味甘温,入脾、胃、肾经,其功用《医林纂要》中有「补助命火,壮阳益精,暖腰脊」之记载。煮食、煎汤或熬膏均可,若与酒同食则效果更佳。阴虚内热者忌服。

辣椒:是家庭厨房常用和调味品之一。其性热味辛,入心、脾经,有温中散寒之功效,煎汤或加入其它食品中同食均可,用量不宜过大,阴虚火旺及患咳嗽、胃痛、目疾、痔疾、皮肤痒痒等病者慎用。(晓娟)