



玉簪是我国著名香花之一，其花蕾形似我国古代妇女头上绾发的玉簪，因而得名。宋代黄庭坚赞玉簪诗：“宴吧瑶池阿母家，嫩琼飞上紫云车（cha）。玉簪堕地无人拾，化作江南第一花。”以动人的神话故事美化其身世，明代田玉衡也以“山梔为之抱惭，水仙见而生妒。”的诗句力推玉簪为传世上品。现在，世界各国都有栽培，凡园林不可少，竞相引栽。

玉簪别名棒玉簪、玉春棒，又名白萼、白鹤仙，属百合科、玉簪属，多年生宿根草本。根状茎粗大，须根多数，株高30—75cm。叶基生成丛，平行脉，先端尖，基部心形，具长柄，叶面有光泽，长15—30cm，宽10—18cm。夏秋间花萼从叶丛中抽出，高出叶片，具一枚膜质苞片状叶，膜质叶长4—6cm，宽1.5—2cm。总状花序，着花9—15朵，花柄长1.2—2cm，基部具苞片，长2—3cm，宽1—1.2cm，晚间开花，白色，浓香不外溢。盛

花冠径9—10.5cm，花被筒下部细小，长5.1—6.2cm，直径2.5—3.5cm，花被裂片6，长椭圆形，长3.5—4.1cm，宽1.2—1.5cm。雄蕊6，下部与花被筒贴生，约与花被等长；雌蕊1，花柱常伸出花被外，子房上位，长1.2—1.4cm。蒴果三棱状园柱形，长5—8cm，径1—1.3cm，种子8—30粒，片状黑色，顶端有翅，形似蝌蚪。喜半阴，忌阳光直射。耐寒不畏热，喜湿又耐旱，喜肥沃能耐贫脊。PH值在5.5—8.0之间。生势强健，适应性广，孤植群植两宜，露地栽零下34℃根系不受冻伤；室内盆栽7℃萌发，22—25℃，昼夜温差8—10℃，生长良好；低于5℃，高于35℃，生长停止。盆栽避免阳光直射和过于干旱，地栽可植于树荫下或建筑物北面。不择土壤，但以肥沃、湿润、排水良好地块为宜。定植宜施基肥，春季或花前每株追施尿素10克、磷酸铵10克，则叶绿花茂，生长更好。地栽3—4年分栽一次，春秋均可，以秋季为宜；盆栽每年秋季翻盆，相宜分株。不遭病害，夏季注意蜗牛及蛴螬（鼻涕虫）危害茎叶。繁殖：①分株，于春季4—5月或秋季10—11月间进行，以秋季分株较好，植株有较长的恢复期，大株来年开花，小株后年开花。如春季分株，大株当年开花，小株次年开花。分株时清除衰败老叶，剪除老根和损伤根，伤口涂以草木灰防腐。②实播，秋季果实成熟后，取下晾干备用，以浅盆或木箱育苗，用腐殖土加1/3细砂拌匀作培养土，剥取种子散播，复土1—1.5cm，保持土壤湿润，温度28℃时20日出苗，20℃时20—30日出苗。经过定植，三年开花。③授粉，玉簪座果、结实率均低，需人工授粉。一般在晚间约6时绽蕾，9时盛开，于9时、10时授粉2次，座果率可达100%，且子实丰满。果实成熟时叶片枯萎，待果皮发黄、

失水松软时采收。其用途：玉簪花雪魄冰姿、浓香袭人，叶片下部青翠，上部碧绿，交相映辉，素净雅致，十分动人，多作装点庭院之用，或配置林荫下作地被，或孤植岩石园中作点缀，或群植建筑物北面作衬映。玉簪花香韵别具风采，亦宜盆栽或作插花，亭台楼阁，窗前案头，随意清供其情趣奇妙。

玉簪花当可供食用，为名贵佳菜，鲜花富含芳香油，可提取芳香浸膏。

玉簪还可作药用，全草入药，民间有鲜叶浸菜子油贴烂脚，鲜草捣烂取汁治内耳流脓，以及鲜草捣烂外敷治疮痍肿痛、蛇虫咬伤等均有疗效。

以上介绍的是普通玉簪，单瓣花。另有复种重瓣玉簪，其雄蕊与雌蕊瓣化，花形丰满，香气浓郁，被视为珍品，但不结果实，只靠无性繁殖，其习性和栽培方法与单瓣玉簪相同。

## 〔宁〕〔安〕〔山〕〔植〕

### 黑龙江省森林植物园

王 秀 珍

宁安山植 (*Crataegus rinensis*) 又名山植混子，蔷薇科山植属。落叶亚乔，树形开张高2—4米。一、二年生的枝条没有刺，当年小枝灰棕色，无光泽、冬芽棕黑色倒卵形无光泽。叶宽卵形长5—6厘米、宽4—5厘米先端急尖，基部宽楔形，边缘有三对裂片，最下边一对较深，有重锯齿、叶柄粗而短约2—3厘米。伞房花序、多花密集、花梗长2—3厘米，花萼钟状、萼片五裂。花白色、花瓣长圆形，花药棕褐色。萼片宿存。果实近球形、直径一厘米，黄红色和鲜红色。成熟后半透明，果肉较面，无酸味，有甜味。果实成熟后不落果。

混合花芽，花、叶齐长，五月中旬展叶开花，花期十天左右。七月末果实成熟。

主要分布在宁安、东京城等地、多生长在河岸、溪旁、路边。对土壤要求不严、一般条件下均能生长。抗逆性与、抗寒均强，抗旱、抗病力强。我园在1968年由东京城林叶局红山桥林场，采种育苗，由野生变家植，在我园生长良好，无病虫害发生。在1977年开始开花结果。并在1979年用它作山植砧木，进行嫁接，亲和力很强、春季枝接高接、成活很好，1985年嫁接已开始结果。

宁安山植：花期早、花多而密、果实鲜红而不落、除食用外还有其观赏价值。而更重要的是因为它抗逆性强，适应性广，在园艺育种上是一种优良的种质资源。宁安山植在育苗繁殖上基本上同山植一样。