

新土,施入有机肥,改善根群生活条件;同时修剪根系,刺激新根发生,增强吸收能力;另外,通过重新上盆栽植,可把老根系疏散开,使其围绕土壤,扩大吸水面积。

倒盆时要先把盆土浇湿,但不要浇透,以免“根球”散裂。片刻后用长刀片在盆壁四周撬松盆土,一手握住桃树基部,把盆半倾倒在地上转,另一手掌拍击盆壁,将植株脱出,把根系捋顺开,剪去病、残、弱根、枯萎根和翘头根(常发生根蘖)再用竹片轻轻拨动“根球”,去掉1/3—1/2外围盆土,小心不要伤及主根、大根。上盆时要先把长根绕盆壁分层植好,再填表土、浇水、然后避光3—5天,如果在阴雨天进行,可不必搬进室内。

倒盆换土在采果后即可进行。因为果实成熟一般在八月末至九月初,正值天晴气爽,白天光照好,气温高,有利于根系恢复和进入第二次生长高峰。天冷后保护叶片,搬到室内可延迟生长到十一月末。这样肥料当年起到作用,有利于树势恢复,促进枝条成熟,花芽饱满。

配制盆土可采用肥田土(或旧盆土)5份,熟马粪3份,大粪干或充分发酵腐熟的鸡鸭粪2份。另外,在3—5公分深的表层盆土内混入20%的阔叶锯末子,可以防止浇水板结,减少水分蒸发和松土次数。

### 五、做好保健工作——防治病虫害

盆桃的害虫主要是红蜘蛛和蚜虫,发生后可用40%的乐果乳油1000倍液进行防治。在通风条件差,遇上低温多雨时偶尔也感染细菌性斑点病,但天气一好转很快就恢复,不用防治。

栽培实践表明,如果把盆桃摆放在通风透光条件比较好的高架(距离地面80—100公分)上,则很少发生病虫害。

(巴彦县农民技术学校衡广信)

## 关于“砧木”中“砧”的读音

嫁接植物时把接穗接在另一个植物体上,这个植物体叫砧木,关于“砧木”中“砧”字,各地读音不同有人念,“zhēn”,有人念“zhān”,新华字典上只有“zhēn”这一个音。因此,应该统一读“zhēn”(枕)音。

河北省石家庄果树研究所 马之胜

## 砀山梨漫话

砀山盛产桃、杏、苹果、葡萄、石榴、柿子、沙果等,是有名的水果之乡闻名遐迩砀山酥梨,就生产在这里。

今日之砀山,大小果树已发展到240多万株,水果年产量在一亿四千万斤左右,而砀山梨产量则占9千万斤,在水果产量中占有重要地位。

砀山梨除畅销国内各大城市外,还远销港澳、美国、加拿大、南洋群岛等国家和地区。

砀山梨黄亮美观,果实硕大,一般是两个梨一斤,最大的梨竟达两斤多重,堪称梨王。它具有皮薄汁多,酥脆的特点,是水果中的佳品。

但是酥梨自花不孕,必须搭配一定数量的授粉品种,以促使其结果和丰产,一般每4行酥梨,可栽培两行授粉品种,使其自然授粉。其中以马蹄黄梨,紫酥梨,歪尾巴梨为最好。砀山酥梨经过贮藏后,肉质变面,香气扑鼻,别有风味,鹅黄梨果大而丰产,尤其耐贮藏远销,是很有发展前途的良种。经专家鉴定,砀山梨中含有糖类,有机酸,矿物质和多种维生素,营养价值很高,有益于身体健康,除鲜食外,还能加工梨酒、梨膏、梨脯、罐头等,很受消费者欢迎。而且梨汁、梨膏有化痰止咳润肺等功效,久服延年益寿。

砀山梨适应性较强,无论是轻微的碱地,沙荒,山脚,丘陵均能生长。

根据许多兄弟省引种砀山梨的经验,在北方引种比较南方表现要好得多,特别是移植到西北各省所结的酥梨,比起砀山梨原产地的酥梨汁水更甜,梨肉亦更加细脆好吃,就是引种到淮河两岸的砀山梨,适应性也很好,梨子的滋味和产量,亦和砀山原产地相仿。

(安徽省萧县党校吕继扬 安徽省砀山园艺场园艺师夏育文。)

## 更正

一、本刊第七期48页栏左上数第24行“批发价3.30元。应改为批发价5.30元。

二、本刊第七期封三《欢迎订阅北方园艺》一文,后数9行以下内容应改为1991年仍为月刊,定价1.20元,全年14.40元,仍在邮局发行,代号14—150 特此周知。本刊编辑部