

# 保护地黄瓜无公害早熟栽培技术

栾非时<sup>1</sup>, 崔喜波<sup>2</sup>

(1. 东北农业大学科技处, 哈尔滨 150030; 2. 哈尔滨市农业供销公司, 哈尔滨 150020)

中图分类号: S62, S642. 2 文献标识码: B 文章编号: 1001-0009(2001)01-0006-02

## 1 品种选择

早熟栽培选长春密刺、新泰密刺、山东密刺、津春四号, 秋冬延后栽培选津研及津杂系列品种。

## 2 培育壮苗

### 2.1 种子处理

黄瓜的许多病害都是因种子感染了病原菌而导致植株在苗期或定植后发病的, 因此播种前必须进行种子消毒处理。按照无公害栽培的要求, 在种子处理时多不能采用药剂拌种, 常采用热水烫种(或称温汤浸种), 既利用高温杀灭病菌。消毒时水的温度和烫种时间必须严格掌握, 要达到杀死病菌又不伤害种子的目的, 常用 45℃~50℃的热水烫种, 持续时间 10~15min。

### 2.2 播种育苗

利用新沙土具有的无菌特点, 黄瓜播种时可直接播在沙箱中, 等到出苗后 2 片子叶展开时再移植到营养土中。黄瓜种子较大, 在子苗阶段, 种子本身的营养已能够满足子苗的生长发育。利用沙箱育苗, 移植时黄瓜根系所受伤害较轻。在黄瓜出土后 5~7d 即可进行移苗。

### 2.3 营养土配制及消毒

移苗所用的营养土是由田土、有机肥、草炭土、细沙等配制而成, 还要加一些过磷酸钙来调节酸碱度。田土必须从 2 年~3 年内没有种过瓜类的大田取, 因为育苗期间许多病害是从床土传染的, 如苗期的猝倒病、立枯病; 生长期间的枯萎病、炭疽病。最好从葱蒜类地中取土。种葱蒜类的土含有硫化物, 可杀死土中的一些病菌。黄瓜育苗用土不能从豆类和向日葵田中取土, 种植豆类的土壤虽然肥力较高, 但侵染豆类的线虫也能危害黄瓜, 所以不能取用; 向日葵是菌核病的主要寄主, 而菌核病危害黄瓜也是非常严重, 因此也不能使用。草炭土含有丰富的有机质和各种元素, 是最理想的育苗用床土。对于育苗用的床土最好采用高温发酵进行消毒, 这种方法不仅杀死病、虫卵, 还能杀死草籽, 并含有丰富的有机质。

### 2.4 苗期管理

播种后出苗前管理的主要方法是保温保湿, 加快育苗。气温应控制为 28℃~30℃; 地温为 22℃~25℃。这样 2~3d 苗即可出齐。达不到这种适宜温度, 将会使出苗时间延长, 若气温超过 30℃以上, 虽出苗快, 但易徒长。苗出齐到真叶已露尖时, 需要较低的温度, 应进行通风换气, 保持白天气温 20℃~25℃, 夜间 15℃~18℃, 地温昼夜在 20℃以上, 较低的气温, 可控制幼茎和子叶徒长。第 1 片真叶至 4 片真叶完全展开后, 白天保持在 25℃~27℃之间, 但夜间气温应控制在较低水平, 以抑制呼吸强度, 增加植株养分积累。地温应保持在 15℃~20℃。定植前 7~10d 应进行秧苗锻炼, 降低温度, 控制水分, 白天气温保持 15℃~20℃; 地温保持 15℃~20℃, 到定植前的 3~5d 夜间气温可降至 5℃左右, 后半夜还可给以 1℃~2℃的短期低温, 经过锻炼后的秧苗, 其顶芽抵抗低温的能力有所增强。

## 3 提早扣棚适时定植

保护地黄瓜栽培, 应秋季扣棚, 使早春地温(10cm 深)尽快提高到 15℃以上。由于无公害栽培对化肥使用的限制, 应多施用有机肥, 以减少化肥的施用量。每公顷施有机肥 150t 以上, 再条施过磷酸钙 375kg 及一定量的钾肥。保护地黄瓜早春栽培, 要选择适宜的安全定植期, 要求连续 3~4d 内, 10cm 深土温稳定在 8℃~10℃以上, 棚内最低气温应稳定通过 5℃以上。如果有临时的加温和保温措施, 则可以适当提早定植。

## 4 定植后的管理

定植后 20d 内应尽量提高地温, 地温应保持在 15℃以上; 结瓜前期, 白天超过 28℃可开天窗或侧窗放风, 但不能放底风, 切忌扫地风, 夜间棚内气温不低于 10℃。进入结瓜期以后, 外界气温逐渐升高, 应针对病害发生进行生态防治。坐瓜时可用 0.2% 的磷酸二氢钾根外追肥, 根瓜采收后应每隔 7~10d 追一次腐熟的大粪稀, 不要用化肥, 结瓜盛期应加大通风, 追肥灌水。黄瓜秧顶棚后, 应及时摘心, 促进回头瓜迅速膨大。

收稿日期: 2000-11-10

5 病害的生态防治

5.1 黄瓜霜霉病的发病条件

黄瓜霜霉病形成孢子需要 83% 以上的空气相对湿度, 空气相对湿度低于 70% 不能产生孢子。霜霉病孢子囊萌发、芽管生长以及芽管从黄瓜叶片的气孔侵入, 要求叶片上有水滴或水膜, 这种水称侵染水。管理中经常保持叶面干燥, 即使叶片上有孢子囊, 也会失去发芽能力。从表 1 中可以看出, 黄瓜霜霉病发生时所要求的生态条件, 主要有较高的温度和较大的空气湿度。当温度和湿度都适宜时, 植株才发病。

表 1 黄瓜霜霉病适宜的温度和湿度

病原体发生 与形成	空气温度(℃)		空气相对 湿 度
	一般范围	最适范围	
孢子囊形成	10~39	15~20	83%以上
孢子囊萌发	5~30	15~22	叶上有水滴或水膜
芽管生长侵入	10~25	16~22	叶上有水滴或水膜
菌丝生长蔓延	16~28	20~24	70%

5.2 黄瓜霜霉病生态防治

根据霜霉病发病特点与黄瓜的生育习性, 可进行四段变温管理(表 2)。为防止夜间温度过高和夜间叶面上形成水膜, 在保护地管理中要放“夜风”(表 3), 以充分满足黄瓜生长发育适宜的温湿度条件, 抑制霜霉病的发生。

表 2 保护地黄瓜霜霉病生态防治温、湿度适宜指标

项目	时 刻			
	07~12	12~18	18~24	24~07
温度(℃)	28~32	20~25	13~15	11~13
湿度(%)	60~70	60 左右	80~90	90~95
持续时间(h)	6	5	6	7

表 3 保护地内温度与夜间放风时间

夜间保护地 内最低气温(℃)	日落后放风 时间(h)	作业参考季节
10	1	5 月中、下旬
11	2	5 月下、6 月上旬
12	3	6 月上、中旬
13	整夜通风	6 月中、下旬

日落后放夜风, 能使上半夜温度下降 1~2 然后关闭通风窗, 对下半夜温度影响不大, 叶片表面形成水膜的时间就会向后推迟。这样, 把病原菌所需要的适宜温度和水膜形成的条件错开, 就能防止病害的感染。

5.3 病、虫害防治技术

对于保护地黄瓜无公害栽培技术, 以生态防治为主, 配合药剂预防。对于白粉病和炭疽病, 在进行生态防治的同时, 可选用多抗霉素、农抗 120、百菌清、灭病威等。对于细菌性角斑病可用 100 万单位硫酸链霉素 200 倍液喷雾防治, 并可与 DT 杀菌剂等交叉使用。对于黄瓜枯萎病, 采用嫁接法, 或在发病初期用 2% 春雷霉素水剂

高效日光节能温室冬春茬黄瓜

育苗关键技术

高 峰, 高 妍 妍,  
侯 绪 宏, 李 维 杰

笔者通过采用无土锯沫子加营养液育冬春茬黄瓜苗收到较好的效果。锯沫子松软、温暖、透气性好, 增温快, 对秧苗扎根和出苗的阻力小。有利于秧苗发根、出苗。1999 年 12 月 5 日, 我们在肇州县永乐镇日光节能温室内用营养土和锯沫子分别进行育苗对比试验, 在同样温度、光照、湿度条件下, 锯沫子所育的苗比营养土育苗提前出苗 24h, 且秧苗出苗整齐, 须根比营养土育苗多 30% 左右, 子叶大而厚, 为后期黄瓜花芽分化奠定了良好的基础。

具体操作如下: 首先做一个长 1m, 宽 80cm, 高 10cm 的木盘, 盘内铺 8cm 厚的锯沫子, 整平压实, 然后用盛开水的细嘴喷壶浇床, 待床温降到 35℃ 时, 把催好芽的黄瓜籽平放, 摆好, 籽与籽之间距离 1.5cm×1.5cm, 播完籽后在籽上覆 1cm 厚的干锯沫子整平、压实。在其上盖地膜。当 50% 黄瓜苗长出时, 及时撤掉地膜, 让秧苗充分绿化。此时注意: 当苗长出时, 上顶部有一层硬盖, 要及时用木条轻轻进行破碎, 有利于出苗。当苗出齐后, 再在其上撒 0.3cm 厚的锯沫子, 填补因出苗时造成的裂缝。当黄瓜苗子叶展平时及时分苗。

用以上方法育的苗, 苗齐、苗壮、出苗快, 请各位生产者不妨一试。(黑龙江省肇州县永乐镇 151202)

500~1000 倍液灌根。对于虫害, 用低毒高效的农药防治。

5.4 肥水管理

采用膜下软管滴灌技术和二氧化碳气体施肥。追肥禁用尿素, 控制其它化肥施用量, 可用叶面肥或磷酸二氢钾等根外追肥。



第一作者简介 梁非时, 女,

1964 年 11 月出生, 汉族, 博士学位, 副教授, 作者先后主持省自然科学基金二项, 副主持省科委重大项目及创新工程项目各一项, 主要参加了农业部、省科委、教委、省基金、市科委等项目达十余项, 在国内核心期刊发表论文二十余篇, 参编论著三部。本人曾获省科技进步二等奖一项, 省农业科技进步二等奖三项, 1999 年荣获中国农业工程学会第三届青年科技奖, 现任黑龙江省农业工程学会理事, 东北农业大学科技处共建办副主任职务。