

申家店林区的野生观赏植物资源及利用

卞 勇

中图分类号: S68.02.4 文献标识码: B 文章编号: 1001-0009(2002)06-0033-01

申家店林区位于黑龙江省桦川县境内,距佳木斯市 35 km(公里)左右,处于东经 130°64', 北纬 46°52'。这里山峦起伏,林海郁郁葱葱,人工林和自然森林相结合,构成典型的针阔叶林区。申家店林区夏秋季温度较高,雨量充沛,土质肥沃,山上为山地暗棕壤,山谷坡地为黑色草甸土,非常适宜植物生长。从春末到深秋,满山披绿,百花争艳,一片生机盎然。因远离市区,人烟稀少,植被没有受到大的破坏,一些珍贵的植物种类保留的较为完整。已知有观赏价值的野生植物近百种,现介绍其中一部分种类。

1 木本观赏植物种类

1.1 柳叶绣线菊(*Spiraea salicifolia* L)别名空心柳。蔷薇科,直立灌木,高约 1 m~2 m(米),分枝多,叶片披针形,两面无毛,叶柄长 1 mm~4 mm(毫米),类似柳树叶。花序为塔状圆锥花序,蔷薇花冠,粉红色;生长于山谷地及道旁较湿润的土壤。开花期 6~8 月,开花时节,束束花序耸立枝顶,随风摇动,别有一番风姿。

1.2 金银忍冬(*Lonicera mackii*)别名金银木。忍冬科,直立灌木,叶对生,叶为卵状披针形至卵状椭圆形,长 5 cm~8 cm(厘米),总花柄短于叶柄。花冠由白色转为黄色,长达 2 cm(厘米),具香气,雄蕊 5 枚,与花柱均短于花冠。金银忍冬树形开展,夏季观花,花色艳丽,特别是到深秋季节,全树挂满红色浆果,一直到初冬不落。金银忍冬生于自然林内,喜欢较肥沃的土壤,多沿小溪流生长。

1.3 刺玫蔷薇(*Rosa darwinia* pall)别名刺玫果。蔷薇科,落叶灌木,茎直立,高 1 m~1.5 m(米),多分枝,上有成对的皮刺,羽状复叶互生,小叶 5~7 片,长椭圆形。花单生或 2~3 朵聚生,直径约 4 cm(厘米),深红色,有香气,蔷薇果球形,红色或橙红色,内含多数瘦果,花期 6~7 月。生于山坡开阔地,阔叶疏林内及林缘灌丛中。

1.4 稠李(*Prunus padus* L)别名臭李子。蔷薇科,落叶乔木,树皮粗糙,高 7 m~10 m(米),单叶互生,叶柄长 2 cm~17 cm(厘米),叶片椭圆形,长 4 cm~11 cm(厘米)。总状花序疏松下垂,长 10 cm~15 cm(厘米),约 15 朵花组成,花白色,核果近球形,黑色有光泽,多汁,直径 6 mm~10 mm(毫米),花期 5~6 月,果期 8~9 月,生于河岸或路边低湿处,山坡杂木林。

1.5 东北山梅花(*Phila delphus schrei kii*)别名毛叶木通。虎耳草科,直立灌木,高 2 m~4 m(米),枝条对生,有毛茸。叶对生,有短柄,叶片长卵形,边缘有锯齿,两面均具毛茸。总状花序生于枝顶,具 5~7 朵花,萼片、花瓣各 4,雄蕊多数,花色洁白,有清香味,花期 6~7 月。蒴果,果期 8~9 月。

2 草本观赏植物种类

2.1 紫斑风铃草(*Campanula*)桔梗科,多年生草本,叶互生,卵状披针形,上部叶无柄。每叶腋生一花,花有柄,花冠呈钟状而下垂,花直径达 3 cm~4 cm(厘米),长约 4 cm(厘米),花期 6~7 月,花冠筒内部具密集的紫红色斑点,故得此名。紫斑风铃草生于林间、林缘、灌丛或草丛间。

2.2 短瓣金莲花(*Trollius ledebourii* Rehb)毛茛科,多年生草本,株高 70 cm~80 cm(厘米),单叶互生。花萼花冠 5 片成一轮,花瓣状蜜叶比萼片短或几乎等长,花为金黄色,花期 6~7 月,生于山坡下湿草甸子或林间湿草地。

2.3 辣蓼铁线莲(*Clematis manshurica* Rupr)别名东北铁线莲,毛茛科,多年生草质藤本,茎攀援,长达 1 m(米),叶对生,1或2回羽状复叶,小叶 5~7 枚,披针状卵形,小叶柄长 2.5 cm~4 cm(厘米),靠叶柄攀援其它植物上,花序腋生,萼片花瓣状 4 枚,白色,花期 6~8 月。另外还有紫花铁线莲(*Clematis fischeri* Tarcl var. *violacea* Maxim)草质藤本,长达 2 m(米),攀援茎,萼片花瓣状 4~5 枚,开展呈钟形,红紫色,花期 6~8 月。棉团铁线莲(*Clematis hexapetala* Pall)草质藤本,攀援茎长达 3 m(米),花大,外被白绒毛,花开时呈白色棉花团状。

2.4 黄金菊(*Hypochaeris grandiflora* Ledeb)菊科,多年生草本,高 30 cm~60 cm(厘米),茎直立少分枝,叶互生无柄,椭圆形,上部抱茎,总苞片多层,复瓦状排列。头状花序单生茎顶,大形,金黄色,生于山坡向阳地或林缘稍干的草甸子。

2.5 剪秋罗(*Lychnis fulgens* Fisch)石竹科,多年生草本,高 25 cm~85 cm(厘米),茎直立,节部略膨大,叶对生,无柄,卵状披针形,花期 6~7 月,花为火红色,1~3 朵或略多生于枝顶,生于山坡草地、林缘较湿处。

2.6 毛百合(*Lilium dahuricum* Ker-Gawl)百合科,多年生草本,鳞茎扁球形,白色,茎直立,高约 50 cm~70 cm(厘米)。叶散生,披针状条形,长 7 cm~14 cm(厘米)。花梗与花被片外密生白毛,花大,钟形,橙红色,有紫色斑点,花期 6~8 月,生于山坡草地及林缘湿润土壤。

2.7 白藓(*Dictamnus dasycarpus*)别名八股牛。芸香科,多年生宿根草本,高达 1 m(米),全株有强烈香味。基部木质根斜出,肉质,根皮为中药白藓皮。奇数羽状复叶,小叶 9~13 枚,总状花序顶生,花大淡紫色,生于林内、林缘、山坡灌丛中。

2.8 狼尾花(*Lysimachia barystachys* Bunge)报春花科,多年生草本,高 50 cm~100 cm(厘米)。单叶互生或近对生,倒披针形。总状花序顶生,向下弯曲状,花冠白色,花期 6~8 月,生于山坡灌丛、林下及沙地。

申家店林区野生观赏植物种类繁多,资源丰富,如东北山梅花扦插易活,柳叶绣线菊可分株繁殖,铁线莲属植物、蝙蝠葛、五味子、穿龙薯蓣等可进行墙面、栅栏等垂直绿化。毛百合、短瓣金莲花、剪秋罗、紫斑风铃草可种植于花坛、花境。如有计划地引种栽培,定向培育,对促进园林建设,开辟绿化资源,美化环境具有重大意义。

(黑龙江农业职业技术学院,佳木斯 154007)

收稿日期: 2002-08-09